



Mapa s odborným obsahem

Výsledky testování citlivosti blýskáček (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2010



Autoři:

Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Jana Poslušná (Agritec Plant Research s.r.o.)

Ing. Pavel Kolařík, doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.)

Ing. Eva Hrudová, Ph.D., Ing. Pavel Tóth, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Ing. Jiří Havel, CSc., Ing. Eva Plachká, Ph.D. (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.)

MAPA S ODBORNÝM OBSAHEM

Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyreteroid lambda-cyhalothrin v roce 2010

Tato mapa s odborným obsahem byla vypracována jako výstup projektu NAZV QJ1230077.

Ing. Marek Seidenglanz (11 %), Ing. Jana Poslušná (5 %), Ing. Pavel Kolařík (6 %), doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. (6 %), Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (6 %), Ing. Pavel Tóth, Ph.D. (6 %), Ing. Jiří Havel, CSc. (6 %), Ing. Eva Plachká, Ph.D. (6 %).

Kontaktní osoba (korespondenční autor): Marek Seidenglanz, seidenglanz@agritec.cz

Vydal: Agritec Plant Research s.r.o. v nakladatelství AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., 1. vydání, Šumperk 2015
<http://www.agritec.cz>

Oponentní posudky vypracovali:

Ing. Jan Kazda, CSc.
(ČZU Praha)

Ing. Jakub Beránek Ph.D.
(ÚKZÚZ)

© Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko; Mendelova univerzita v Brně, Brno; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří; Zkušební stanice Kluky, spol. s r.o., Kluky u Písku; 2015

Tato publikace nesmí být přetiskována vcelku ani po částech, uchovávána v médiích, přenášena nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez uvedení osoby, která má k publikaci práva podle autorského zákona nebo bez jejího výslovného souhlasu. S případnými náměty na jakékoliv změny nebo úpravy se obraťte písemně na autory nebo ÚKZÚZ (uživatel výsledků).

ISBN: 978-80-87360-38-5

Obsah

Obsah.....	3
Anotace.....	4
Annotation.....	4
Úvod.....	6
I. Cíl.....	9
II. Vlastní popis vytváření mapy a interpretace výsledků na mapě uváděných.....	10
II.1. Metodika testování.....	10
II.1.1. Sběry hmyzu.....	10
II.1.2. Laboratorní hodnocení.....	11
II.1.3. Vlastní testování.....	11
II.1.4. Počet srovnávaných populací.....	12
II.2. Výsledky.....	13
II.2.1. Elektronická mapa s odborným obsahem.....	36
II.3. Shrnutí výsledků testování provedených v roce 2010 a praktická doporučení.....	38
III. Vyjádření se k novosti postupů.....	40
IV. Závěr.....	40
V. Oponenti předkládané mapy s odborným obsahem.....	40
VI. Literatura.....	41
VII. Seznam publikací, které předcházely mapě s odborným obsahem.....	42

Anotace

Seidenglanz et al. (2015): Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

Předkládaná mapa s odborným obsahem vychází z výsledků získaných při řešení projektu podporovaného NAZV MZe ČR č. QJ1230077. Shrnuje a interpretuje výsledky testování citlivosti populací blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin laboratorní metodou *Adult vial test* (lahvičkový test, metoda podle IRAC č. 011 verze 3). Při testech v roce 2010 byla porovnávána citlivost 125 populací odebraných na různých lokalitách v České republice. Účinná látka lambda-cyhalothrin je např. součástí přípravku KARATE se ZEON technologií 5 CS (50 g ú.l./l). Na blýskáčky v řepce je lambda-cyhalothrin registrován v dávce 5 g/ha. Maximální registrovaná dávka do řepky ozimé je v ČR 7,5 g lambda-cyhalothrinu/ha. Tato dávka v testech sloužila jako základní testovaná dávka (= 100% dávka). Od této dávky se odvíjelo sestavení celého testovaného spektra: 0% (kontrola), 4% (0,3 g ú.l./ha), 20% (1,5 g ú.l./ha), 100% (7,5 g ú.l./ha), 500% (37,5 g ú.l./ha). Pyretroid lambda-cyhalothrin se řadí do skupiny esterických pyretroidů. Tato skupina insekticidů je rezistencí blýskáčků ohrožena nejvíce. Existují doklady o křížové rezistenci blýskáčků k účinným látkám patřícím do této skupiny insekticidů. Mapa je zpracována tak, aby mohla přímo sloužit zemědělským odborníkům: Státním úřadům (ÚKZÚZ), agronomům, zemědělským výzkumníkům, zemědělským poradcům, studentům zemědělských škol a pedagogům na těchto školách. Veškerá data v tomto dokumentu i na vlastní mapě s odborným obsahem) jsou volně přístupná (Google aplikace). Přístup k nim je bezplatný. Pro správnou interpretaci a pochopení výsledků vizualizovaných na mapě je nutné seznámit se alespoň s částí II.2. (= výsledková část) tohoto dokumentu.

Klíčová slova: Blýskáček řepkový (*Meligethes aeneus*); blýskáčci (*Meligethes* spp.); rezistence; lambda-cyhalothrin; pyretroid; *Adult vial test*; IRAC; IRAC metoda 011 verze 3.

Annotation

Seidenglanz et al. (2015): The results of pollen beetle's (*Meligethes* spp.) susceptibility testing to pyrethroid lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2010

This specialized map is based on the results of research project granted by the Czech Ministry of Agriculture Grant Agency (NAZV): QJ1230077. The map summarizes and interprets results of pollen beetle's (*Meligethes* spp.) susceptibility testing to pyrethroid Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2010. The used laboratory method was IRAC Adult vial test no. 011 version 3. In total 125 *Meligethes* populations sampled on different localities in the Czech Republic were compared. The active ingredient Lambda-cyhalothrin is registered in CZ against pollen beetles on oilseed rape at dose: 5 g a.i. per ha. The maximal registered dose of the active ingredient for use in winter oil-seed rape in CZ is: 7,5 g a.i. per ha. Just the dose

served to us as a basic tested dose (= 100 %) and the other tested doses were related to that. The whole spectrum of the tested doses consisted from the progressive gradient of these doses: 0% (untreated), 4% (0,3 g a.i./ha), 20% (1,5 g a.i./ha), 100% (7,5 g a.i./ha), 500% (37.5 g a.i./ha). The pyrethroid Lambda-cyhalothrin is in a group of esteric pyrethroids. These insecticides are the most endangered group with the phenomenon of pollen beetle's resistance. There is a proved cross resistance against the active ingredients in the European pollen beetles populations. This map is compiled to be understandable to agricultural experts: Specialists from Central institute for Supervising and Testing in Agriculture, agricultural researchers, agricultural consultants, students and teachers of agricultural schools and universities and especially farmers. All the data and results published in this document (lower) and in the electronic map are freely available and free of charge. For correct interpretation of the results presented on the map (Google free application) it is necessary for the map user to get to know (in detail) the part II.2. (part RESULTS) of this document.

Key words: Pollen beetle (*Meligethes aeneus*); *Meligethes* spp.; lambda-cyhalothrin; resistance to pyrethroids; Adult-vial test; IRAC; IRAC method 011 version 3.

Úvod

V minulosti byla ochrana řepky proti blýskáčkům v Evropě založena hlavně na aplikaci pyretroidních insekticidů. Hlavním důvodem byla omezená dostupnost insekticidů s odlišným mechanismem účinku, které by mohly být plně využitelné v ochraně proti nim. Pyretroidy (esterické) až do období registrace neonikotinoidů (acetamiprid, thiacloprid) neměly plnohodnotnou alternativu k prostrřídávání. Působily tak jako silný a dlouhodobý selekční faktor na populace blýskáčků. Z historie záznamů o fenoménu rezistence vyplývá vysoká pravděpodobnost pozbývání účinnosti pesticidů po dvaceti letech jejich intenzivního využívání v polních podmínkách (Metcalf & Müller, 2000). Tato skutečnost je obecně platná u všech pesticidů (fungicidy, herbicidy a insekticidy). Za první informace o rezistenci blýskáčků na pyretroidy v Evropě jsou obvykle považovány záznamy o selhání pyretroidů v polních podmínkách v regionu *Champagne* v severovýchodní Francii, které jsou datovány do roku 1999. Vzhledem k tomu, že pyretroidy začaly být plně využívány v řepce v evropských zemích tak od poloviny devadesátých let 20. století, trvalo francouzským blýskáčkům přibližně patnáct let, než si rezistenci na tuto skupinu vytvořili. V první dekádě 21. století začal postupně narůstat seznam zemí, ve kterých byl potvrzován (různými metodami) výskyt populací blýskáčků s výrazně sníženou citlivostí na pyretroidy. V roce 2000 potvrdili poprvé výskyt těchto populací Švýcaři a Švédové, v roce 2001 Dánové, v roce 2002 Němci. Ti se od té doby monitoringu věnují velice intenzivně a jsou vlastně lídry výzkumu rezistence v Evropě. Od roku 2005 přibývá zpráv o výskytu rezistentních populací blýskáčků v Polsku. Hned od počátku bylo zřejmé, že problém rezistence blýskáčků není záležitost jednotlivých nejvíce postižených zemí resp. regionů, ale že jde o fenomén evropský, i když se v jednotlivých zemích (regionech) projevuje různě, tedy různě intenzivně. Ze zemí, ve kterých již od počátku řešení probíhal monitoring, se jako téměř zcela nepostížené jevíly Rakousko a Velká Británie. Od roku 2008 je potvrzen výskyt blýskáčků se signifikantně sníženou citlivostí na pyretroidy i v těchto zemích.

Mechanismus rezistence blýskáčků proti pyretroidům

V souvislosti s rezistencí hmyzích škůdců (nejen blýskáčků) proti pyretroidům se považují za důležité dva mechanismy rezistence, **ztráta citlivosti cílového místa** (= *target site insensitivity* = *knock down resistance* = někdy zkracováno na: *kdr resistance*) a **metabolická rezistence** (*metabolic resistance*).

Na základě předchozích problémů s polní rezistencí hmyzích škůdců proti pyretroidům se předpokládalo, že tím hlavním mechanismem rezistence bude i u blýskáčků ztráta citlivosti cílového místa. Příčinou tohoto typu rezistence je mutace, která se projevuje změnou aminokyselinového složení v proteinové složce receptoru pro pyretroidy na nervovém axonu. Pyretroid se vůbec nemůže navázat na membránu nervové buňky a tím pádem ani působit. V

roce 2008 byl tento typ rezistence prokázán u několika populací blýskáčků v Dánsku (Nauen, 2009). U střeoevropských populací blýskáčků se zřejmě tento typ rezistence nevyskytuje.

Obecně u evropských blýskáčků je nejdůležitějším typem rezistence metabolická rezistence. Ve vývoji metabolické rezistence hrají u hmyzu zásadní roli ty enzymatické (proteinové) skupiny, pro které je typický široký rozsah substrátové specificity. To jsou monooxygenázy cytochromu P₄₅₀, carboxylesterázy a glutation-S-transferázy (GST). U blýskáčků hrají zásadní roli monooxygenázy cytochromu P₄₅₀. Příčinou rezistence je zvýšená hladina (a aktivita) těchto enzymů u méně citlivých (či až zcela necitlivých) jedinců (Slater et al., 2011a,b; Moorers, 2010; Philppou, 2010). Méně citliví jedinci jsou schopni oxidovat pyretroidní účinnou látku, učinit ji netoxickou a následně ji z těla vyloučit. Velkým problémem rezistence založené na monooxygenázách cytochromu P₄₅₀ je to, že její podstatou je skupina enzymů tvořená ve skutečnosti velkým množstvím různých enzymů s různou substrátovou specificitou. Některé monooxygenázy jsou substrátově velmi specifické, stačí malá změna ve struktuře molekuly a už ji nedokáží oxidovat (např. záměna esterické vazby za etherickou; přítomnost či nepřítomnost nějaké skupiny na řetězci atd.). Na druhou stranu monooxygenázy mohou mít i širokou substrátovou specificitu. Monooxygenáz je ohromné množství a z dostupných údajů není zřejmé, které konkrétně jsou spojené s problematikou rezistence blýskáčků. Na některé populace blýskáčků tak mohou mít dobrou účinnost etherické pyretroidy (u nás etofenprox) místo již neúčinných esterických pyretroidů (např. lambda-cyhalothrin, cypermethrin, alfa-cypermethrin, zeta-cypermethrin, gamma-cyhalothrin, esfenvalerate, beta-cyfluthrin). Jiné populace mohou být rezistentní proti pyretroidům celkově.

Monooxygenázy cytochromu P₄₅₀ byly nalezeny ve všech říších životních forem, tj. u archeí, bakterií, hub, rotlin i živočichů. U člověka např. hrají významnou úlohu při metabolismu cizorodých látek (např. léčiv). Bez těchto enzymů by si člověk neporadil ani s ibuprofenem.

Snahy monitorovat pravděpodobně postupující rezistenci blýskáčků proti pyretroidům (popř. dalším insekticidům s odlišným mechanismem účinku) v Evropě koordinuje *International Resistance Action Committee (IRAC) – Pollen Beetle Working Group*. Výsledky jejich územně rozsáhlých studií jsou volně přístupné na <http://www.iraac-online.org>. Vyplývá z nich především to, že vedle nejvíce postižených zemí (podle IRAC: Francie, Německo) je situace velmi špatná i ve střední Evropě, jmenovitě v ČR a v Polsku (Slater et al., 2011; Seidenglanz et al., 2015). Převládají zde vysoce rezistentní a rezistentní populace blýskáčků (podle IRAC kategorizace populací se rozlišuje pět stupňů rezistence, popsáno níže v metodické části). Naše výsledky (předkládané v této certifikované mapě v řadě publikací: např. Seidenglanz et al., 2015) to potvrzují.

Pro hodnocení citlivosti blýskáčků získaných z různých lokalit nebo ze stejných lokalit ale v různou dobu (tedy pro srovnání citlivostí různých populací) se nejlépe hodí srovnání jejich

hodnot LD_{50} (popř. LD_{90}) ve vztahu k danému insekticidu. K odhadu těchto hodnot pro jednotlivé populace se využívá obvykle některý druh regresní analýzy, nejčastěji probitová analýza. Jednotlivé populace lze mezi sebou srovnávat také na základě porovnání laboratorních účinností konkrétních testovaných dávek (např. dávek odpovídajících dávce registrované, resp. dávek vyšších či nižších o určitý násobek ve vztahu k dávce registrované).

Stručný popis vývoje rezistence blýskáčka řepkového proti esterickým pyretroidům v ČR (tento popis pro každou mapu vždy aktualizován dle nově získaných výsledků; zatím poslední rok testování: 2014)

Od roku 2008, kdy byl monitoring citlivosti blýskáčků (nejprve v rámci projektu NAZV QH81218 a pak v rámci navazujícího projektu QJ1230077) na pyretroidy (lambda-cyhalothrin, později se spektrum pyretroidů rozšířilo o etofenprox, cypermethrin a tau-fluvalinate) zahájen, patří ČR mezi země s potvrzeným výskytem rezistentních populací blýskáčků na esterické pyretroidy. V prvních letech byla zjištěna snížená účinnost těchto pyretroidů v severních, zejména podhorských oblastech ČR. V některých regionech byla tehdy situace relativně lepší (jižní Čechy, jižní Morava, Českomoravská vrchovina). Postupně (do roku 2012) došlo k výraznému zhoršení prvotního stavu i v těchto regionech. V letech 2010 a 2011 jsme zaznamenali významné snížení účinnosti na jižní Moravě a na Českomoravské vrchovině, v roce 2012 také v jižních Čechách. V roce 2013 se vyskytovaly populace s výrazně sníženou citlivostí na pyretroid lambda-cyhalothrin na celém území ČR. V letech 2013 a 2014 na území ČR již zcela dominovaly rezistentní a vysoce rezistentní populace na esterický pyretroid lambda-cyhalothrin (tab. 1). V rámci našich testů je lambda-cyhalothrin nejdéle testovaný pyretroid a reprezentuje esterické pyretroidy registrované na relativně nízké dávce (do 10 g ú.l./ha; tab. 2). Tyto pyretroidy jsou rizikem polního selhávání ohroženy nejvíce. Celkově lze konstatovat, že mezi lety 2008 a 2014 docházelo ke stálému zhoršování situace ve vývoji rezistence českých populací blýskáčků k esterickým pyretroidům.

Tab. 1 - Srovnání podílů populací blýskáčků s různou úrovní rezistence (citlivosti) dle kategorizace IRAC (*Insecticide Resistance Action Committee*) k esterickému pyretroidu lambda-cyhalothrin v jednotlivých ročníkových kolekcích. V roce 2012 bylo testováno i 10 slovenských populací (SK). Výsledky lze stáhnout i k dalším esterickým pyretroidům registrovaným v dávkách 10 a méně g ú.l./ha. Použitá laboratorní metoda: IRAC 011 v.3.

insekticid	ročník	Podíl populací s určitým stupněm rezistence (%)				
		VC	C	SR	R	VR
lambda-cyhalothrin	2009	11.71	18.02	25.23	33.33	11.71
	2010	4	22.4	21.6	43.2	8.8

	2011	0	3.92	13.73	61.77	20.59
	2012 (CZ)	0	1.21	4.82	59.04	34.94
	2012 (SK)	0	0	70	30	0
	2013	0	0	7.32	65.85	26.83
	2014	0	0	5.71	48.57	45.71

VC = vysoce citlivá populace; C = citlivá populace; SR = středně rezistentní populace; R = rezistentní populace; VR = vysoce rezistentní populace

Tab. 2 - Pyretroidní účinné látky registrované v ČR do řepky olejky na blýskáčka řepkového

účinná látka	registrovaná dávka (g ú.l./ha)	druh pyretroidu
deltamethrin	7.5	esterický
lambda-cyhalothrin	5	
gamma-cyhalothrin	4.8	
alpha-cypermethrin	10	
zeta-cypermethrin	10	
esfenvalerate	7.5	
cypermethrin	25	
beta-cyfluthrin	5.16	
tau-fluvalinate	48	esterický*
etofenprox	57.5	eterický

*molekula obsahuje také esterickou vazbu, ale od ostatních esterických pyretroidů se podstatně liší

Na blýskáčky v řepce je lambda-cyhalothrin registrován v dávce 5 g/ha (viz také **tab. 1**). Maximální registrovaná dávka do řepky ozimé je v ČR 7,5 g lambda-cyhalothrinu / ha. Tato dávka v níže popisovaných experimentech sloužila jako základní testovaná dávka (= 100% dávka). Od této dávky se odvíjelo sestavení celého spektra testovaných dávek: 0% (kontrola), 4% (0,3 g ú.l./ha), 20% (1,5 g ú.l./ha), 100% (7,5 g ú.l./ha), 500% (37.5 g ú.l./ha). Pyretroid lambda-cyhalothrin se řadí do skupiny esterických pyretroidů. Tato skupina esterických pyretroidů patří v Evropě z hlediska rezistence blýskáčka řepkového (*Meligethes aeneus*) k nejvíce ohroženým. Existují doklady o křížové rezistenci blýskáčků k účinným látkám patřícím do této skupiny insekticidů.

I. Cíl

Předkládaná mapa má posloužit jako zdroj informací pro pracovníky ÚKZÚZ (SRS je podle smlouvy sepsané na počátku řešení projektu uživatelem výsledků projektu QJ1230077) při vytváření (nebo podílení se na tvorbě) konkrétních závazných předpisů nelegislativní či

legislativní povahy a dokumentů (antirezistentní strategie, zavádění metod integrované ochrany rostlin). Především má ovšem sloužit odborné veřejnosti (pěstitelé, výzkum, poradenství) jako zdroj aktuálních informací. Přístup k údajům je volný (viz níže). Předkládaná mapa by měla být přínosem ke zvýšení obecného povědomí o důležitém fenoménu současného evropského zemědělství do velké míry produkčně závislého na využívání pesticidů: tedy o možnosti vzniku (získání, selekce) rezistence téměř u jakéhokoliv škodlivého organismu k téměř jakémukoliv druhu pesticidu, pokud je s tímto nakládáno nevhodně.

II. Vlastní popis vytváření mapy a interpretace výsledků na mapě uváděných

II.1. Metodika testování

II.1.1. Sběry hmyzu

Cílem bylo nashromáždit dostatečně vysoký počet vzorků populací *Meligethes aeneus* resp. *Meligethes* spp. (používáme také pojem: sběrů blýskáčků) z různých regionů ČR. ČR se řadí z hlediska intenzity pěstování a podílů ploch orné půdy osévané brukvovitými plodinami (nejen řepkou ozimou, ale také řepkou jarní, hořčicí a dalšími druhy) mezi nejvýznamnější pěstitele v Evropě (Německo, Francie). V sezoně 2013/2014 se výměra, na níž se v ČR pěstuje řepka ozimá, vyšplhala na úroveň 400 tis. ha. Při plánování sběrových aktivit nebyly žádné regiony, resp. oblasti preferovány. Např. z hlediska různé úrovně intenzity hospodaření na půdě, z hlediska odlišných meteorologických, klimatických a půdních podmínek ani z hlediska geografického (nadmořská výška). Větší počet sběrů získaný z určitých regionů je dán technickými možnostmi řešitelského týmu (dojezdové vzdálenosti). Odběry byly prováděny v době, kdy rostliny řepky (popř. hořčice, máku) byly oschlé (děšť, rosa) a porost nebyl ošetřen insekticidem (resp. minimálně 14 dní po aplikaci). Z každé lokality bylo získáno minimálně 500 imag blýskáčků. Při odběrech bylo použito smýkání květenství či sklepávání brouků z vrcholových květenství. Do transportních lahví se před vkládáním hmyzu vložila květenství rostlin jako zdroj potravy pro transportované jedince. Společně se sběrem byly zaznamenány tyto údaje o lokalitě:

- 1) Lokalita – co nejpřesnější určení místa odběru; nejbližší obec a okres.
- 2) Datum odběru
- 3) Hodina odběru – čas, kdy byl odběr ukončen
- 4) Údaje o plodině – druh, růstová fáze (zejména, co se týče stavu generativních orgánů)
- 5) Údaje o předcházejících insekticidních postřicích - (je-li to možné)

Vzorek blýskáčků (popř. více vzorků) s požadovanými údaji byl co nejrychleji dopraven do některé z laboratoří, kde proběhlo testování: AGRITEC, MENDELU, ZVT Troubsko, Oseva VaV. K vlastním testům byli použiti pouze aktivní jedinci ve velmi dobrém stavu.

II.1.2. Laboratorní hodnocení

Laboratorní metodou použitou pro hodnocení citlivosti blýskáčků k účinné látce lambda-cyhalothrin byl lahvičkový test (*adult-vial-test*) doporučovaný pro pyretroidy *Insecticide Resistance Action Committee* (IRAC), která koordinuje práce v oblasti hodnocení rezistence hmyzu proti insekticidům v Evropě. Pro pyretroidy je určena Metoda č. 011 (Met 011, verze 3; originál verze na: <http://www.irac-online.org>). Roztoky lambda-cyhalothrinu (pracuje se s analytickým vzorkem čisté účinné látky) se aplikují do skleněných lahviček se známým vnitřním povrchem (v našem případě: 37,97 cm², lahvičky od firmy p-Lab) ve velmi nízkých koncentracích pomocí dávkovacích pipet (HandyStep). Jako rozpouštědlo slouží aceton. Cílem aplikace je dosáhnout rovnoměrného pokrytí vnitřních stěn testovacích lahviček příslušnou dávkou účinné látky: určitá dávka v µg ú.l./cm² povrchu lahvičky odpovídá určité hektarové dávce. V roce 2010 byla účinná látka lambda-cyhalothrin aplikována v následujících dávkách: 0% (kontrola, do lahviček pouze aceton, který se vypaří), 4% (0,3 g ú.l./ha), 20% (1,5 g ú.l./ha), 100% (7,5 g ú.l./ha, maximální registrovaná dávka pro lambda-cyhalothrin do řepky ozimé v ČR; běžná evropská polní dávka), 500% (37,5 g ú.l./ha). Příprava zásobních roztoků účinných látek byla prováděna v akreditované chemické laboratoři firmy AGRITEC. Zásobní roztoky pak byly distribuovány na jednotlivá pracoviště, kde probíhalo vlastní testování (AGRITEC Šumperk, MENDELU Brno, ZVT Troubsko, Oseva VaV Opava). Na těchto pracovištích pak probíhala vlastní příprava testovacích sad (lahviček). Příprava lahviček před vlastním testem probíhala následovně: Do každé testovací lahvičky byl z příslušného zásobního roztoku (čistý aceton; 4% dávka, 20% dávka, 100% dávka, 500% dávka) přenesen 1 ml tekutiny (naředěno tak, aby v 1 ml bylo potřebné množství ú.l.). Lahvička s roztokem se pak umístila na otáčející se válečky rolleru a pomocí nich byla účinná látka distribuována rovnoměrně na vnitřní stěny za postupného odpařování rozpouštědla (aceton). Po odpaření acetonu zůstala na vnitřních stěnách rovnoměrně rozprostřená vrstva lambda-cyhalothrinu. Pro každý sběr blýskáčků (tedy na 1 test) byla připravena sada skládající se z 15 ošetřených lahviček (3x kontrola bez insekticidu, 3x 4% dávka, 3x 20% dávka, 3x 100% dávka, 3x 500% dávka). Jednoduše řečeno, postupovalo se zcela v souladu s výše zmíněnou metodikou IRAC 011 (v.3).

II.1.3. Vlastní testování

Do předem připravených lahviček se vkládají dospělci blýskáčků (10 imag/lahvičku; 3 opakování/dávku) odebraní z určité lokality. Jejich reakce na jednotlivé dávky účinné látky jsou hodnoceny po 24 hodinách (v určitých případech byla provedena hodnocení i po jedné a po 5 hodinách – *tato hodnocení mají doplňkový význam*). Po 24 hodinách jsou brouci z lahviček vysypáni na dobře osvětlený bílý papír a posouzeny jejich reakce a chování. Na základě charakteru reakcí jsou brouci zařazeni buď do kategorie 1 či 2:

Kategorie 1: *Živí a aktivní jedinci*: sem patří jedinci zcela bez pozorovatelných symptomů postižení a ti, kteří jsou postiženi jen lehce (jsou schopni koordinovaného pohybu po nohou).

Kategorie 2: *Jedinci v křeči (= těžce postižení) a mrtví jedinci*: myslí se jedinci v těžké křeči; tedy ti, kteří sice nejsou mrtví, ale nejsou již schopni koordinovaného pohybu po nohou a jedinci mrtví (bez viditelných projevů života).

Pro každou testovací lahvičku (dávka a opakování) se zaznamenal počet brouků v kategorii 1 a počet brouků v kategorii 2. Na základě podílu brouků v kategorii 2 se stanovilo procento mortality pro jednotlivé dávky a opakování (lahvičky). Tyto hodnoty pak byly využity pro výpočet procent účinnosti a odhad letálních dávek (LD₅₀, LD₉₀, LD₉₅ a popř. i LD_{99,99}). Pro jednotlivé sběry (= populace) se zjistily hodnoty účinnosti (dle Abbotta; 1925) dosažené jednotlivými testovanými dávkami (pro dobu expozice 24 hodin). K vyjádření hodnot letálních dávek (LD_{50-99,99} v g ú.l./ha) byl využit software Polo Plus (LEORA software). Každému sběru (= populaci) byl dále přiřazen stupeň rezistence dle kategorizace užívané v IRAC (metodika IRAC č. 011 v.3). Jsou rozlišovány tyto kategorie (= stupně rezistence):

st. 1 = vysoce citlivá populace (laboratorní účinnosti 100% dávky i 20% dávky vyjádřené dle Abbotta musí dosáhnout hodnoty 100 %)

st. 2 = citlivá populace (laboratorní účinnost 100% dávky vyjádřená dle Abbotta musí dosáhnout hodnoty 100 %; laboratorní účinnost 20% dávky vyjádřená dle Abbotta je pod hodnotou 100 %)

st. 3 = středně rezistentní populace (laboratorní účinnost 100% dávky vyjádřená dle Abbotta se pohybuje v intervalu od 90 do 99,99 %)


st. 4 = rezistentní populace (laboratorní účinnost 100% dávky vyjádřená dle Abbotta se pohybuje v intervalu od 50 do 89,99 %)

st. 5 = vysoce rezistentní populace (laboratorní účinnost 100% dávky vyjádřená dle Abbotta je pod hodnotou 50 %)

Toto členění bylo využito např. i v tabulce 1 uvedené výše.

II.1.4. Počet srovnávaných populací

Při testech v roce 2014 byla porovnávána citlivost 125 populací blýskáčků odebraných na různých lokalitách v České republice. Lokality, na kterých byly provedeny sběry imag, jsou na **obr. 1**. Čísla lokalit (= sběrů, populací) uvedená na obr. 1 odpovídají číslům populací ve všech následujících tabulkách, grafech a mapách.



Obr. 1 - Na mapě jsou uvedena místa, ze kterých byly v roce 2010 získány vzorky populací blýskáčků (č. 1 - 125). Čísla lokalit (populací) uvedená v tabulkách, grafech i v této mapě si navzájem odpovídají.

II.2. Výsledky

Výsledky testování jsou shrnuty do **tabulek 3 a 4**, **grafů 1–6** a geograficky vyjádřeny na **obr. 2, 3 a 4** (různé kopie mapy přístupné v Google aplikaci). Na konci výsledkové části (II.2.) se nachází popis, jak s mapou v google aplikaci správně pracovat. Na této mapě jsou k jednotlivým bodům (= lokality, ze kterých byly odebrány jednotlivé populace blýskáčků) přiřazeny nejdůležitější výsledky zjištěné pro danou populaci (výsledky se objeví po jednoduchém kliknutí na konkrétní bod). Jedná se o data z **tabulek 3 a 4** přiřazená k jednotlivým místům na mapě. Jinak řečeno jde o geografické vyjádření **těchto dvou tabulek**. Mapu si lze v Googlu libovolně zvětšovat či zmenšovat a získat tak ucelenější představu o monitorovaném území. **Aby uživatelé mapy mohli data správně využít pro svou práci (tedy přiřadit jim jen ten význam, který mají, nepřeceňovat je nebo naopak je nepodceňovat) měli by se seznámit s jejich interpretací v následujícím textu (výsledková část II.2.).**

Tab. 3 - Výsledky testování citlivosti blýskáčků na lambda-cyhalothrin v roce 2010: průměrné laboratorní účinnosti max. registrované (7,5 g ú.l./ha) a 5-násobně nižší dávky a přiřazené stupně rezistence (st. 1-5) jednotlivým populacím na základě IRAC kategorizace (použitá metoda *Adult vial test* IRAC č. 011 v.3)

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec (okres)	datum sběru	kontakt. lab. účinnost max. registr. dávky 7,5 g/ha (%)	kontakt. lab. účinnost dávky 1,5 g/ha (%)	stupeň rezistence populace dle IRAC (1 - 5)
1	Rapotín (SU)	20.4.	31.10	9.40	5
2	Postřelmov (SU)	7.5.	46.67	23.33	5
3	Dubicko (SU)	7.5.	56.67	26.67	4
4	Dolní Roveň Litětiny (PU)	13.5.	56.67	23.33	4
5	Přelouč Lhota (PU)	13.5.	53.33	40.00	4
6	Úmonín (KH)	13.5.	66.67	56.67	4
7	Litomyšl (SY)	13.5.	61.83	30.00	4
8	Hůrka (CH)	17.5.	36.67	10.00	4
9	Častolovice (RK)	19.5.	56.67	20.00	4
10	Nekoř - Bredůvka (UO)	19.5.	66.67	3.33	4
11	Rapotín II (SU)	20.5.	73.33	43.33	4
12	Velký Týnec (OL)	24.5.	63.33	20.00	4
13	Senice na Hané (OL)	24.5.	50.00	20.00	4
14	Jezernice (PR)	24.5.	70.00	10.00	4
15	Vyškov (VY)	24.5.	66.67	36.67	4
16	Slavoňov (SU)	24.5.	53.33	36.67	4
17	Dobrovice (MB)	3.6.	66.67	20.00	4

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec (okres)	datum sběru	kontakt. lab. účinnost max. registr. dávky 7,5 g/ha (%)	kontakt. lab. účinnost dávky 1,5 g/ha (%)	stupeň rezistence populace dle IRAC (1 - 5)
18	Turnov (SM)	3.6.	50.00	23.33	4
19	Dolní Černilov (HK)	3.6.	60.00	13.33	4
20	Nymburk (NB)	3.6.	66.67	56.67	4
21	Lánov u Vrchlabí (TU)	3.6.	60.00	16.67	4
22	Jaroměřice n/R (TR)	19.5.	83.33	66.67	4
23	Liberec (LB)	3.6.	46.67	23.33	5
24	Prostějov (PV)	24.5.	73.33	36.67	4
25	Chomutov (CV)	20.5.	36.67	23.33	5
26	Javorník (JE)	20.5.	53.33	30.00	4
27	Zlaté Hory (JE)	20.5.	56.67	33.33	4
28	Želeč (TA)	26.4.	53.33	30.00	4
29	Třebohostice (ST)	26.4.	96.67	96.67	3
30	Tismice (KO)	26.4.	30.00	20.00	5
31	Sepekov (PI)	26.4.	83.33	56.67	4
32	Staňkov (DO)	24.5.	96.67	76.67	3
33	Pluhův Žďár (JH)	28.4.	92.20	51.83	3

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec (okres)	datum sběru	kontakt. lab. účinnost max. registr. dávky 7,5 g/ha (%)	kontakt. lab. účinnost dávky 1,5 g/ha (%)	stupeň rezistence populace dle IRAC (1 - 5)
34	Chvalkovice (NB)	29.4.	30.00	3.33	5
35	Krč (PI)	10.5.	93.33	50.00	3
36	Hrejkovice (PI)	10.5.	96.67	86.67	3
37	Kasejovice (PJ)	26.4.	93.33	86.67	3
38	Kestřany (PI)	10.5.	96.67	66.67	3
39	Kladruby (RO)	11.5.	96.67	80.00	3
40	Kluky u Písku (PI)	26.4.	100.00	100.00	1
41	Bor u Tachova (TC)	17.5.	53.33	43.33	4
42	Mrákov (DO)	24.5.	76.67	46.67	4
43	Munice (CB)	25.4.	90.47	62.23	3
44	Nebovidy (KO)	26.4.	73.33	13.33	4
45	Neveklov (BN)	13.5.	80.00	60.00	4
46	Nová Včelnice (JH)	31.5.	93.33	66.67	3
47	Ovčíný (BN)	13.5.	83.33	56.67	4
48	Hostěradice (ZN)	28.4.	70.00	36.67	4
49	Jezeřany (ZN)	28.4.	83.33	63.33	4
50	Našiměřice (ZN)	28.4.	80.00	56.67	4

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec (okres)	datum sběru	kontakt. lab. účinnost max. registr. dávky 7,5 g/ha (%)	kontakt. lab. účinnost dávky 1,5 g/ha (%)	stupeň rezistence populace dle IRAC (1 - 5)
51	Znojmo (ZN)	28.4.	63.33	26.67	4
52	Troubsko I (BO)	26.4.	53.33	36.67	4
53	Trousco II (BO)	1.6.	90.00	46.67	3
54	Třebíč (TR)	10.5.	83.33	66.67	4
55	Kralice nad Oslavou (TR)	10.5.	86.67	76.67	4
56	Telč (JI)	10.5.	96.67	16.67	3
57	Zakřany (BO)	10.5.	96.67	56.67	3
58	Opava Kylešovice I (OP)	19.4.	90.00	10.00	3
59	Opava Kylešovice II (OP)	10.5.	93.33	13.33	3
60	Hodslavice (NJ)	24.5.	57.77	26.87	4
61	Výškovice u Bílovce (NJ)	24.5.	43.23	13.57	5
62	Zubří (ZR)	24.5.	78.27	36.33	4
63	Příbor (NJ)	24.5.	77.57	56.00	4
64	Stará Ves n/O. (FM)	25.5.	71.67	37.00	4
65	Klimkovice (OV)	25.5.	44.23	3.70	5
66	Sviadnov (FM)	25.5.	67.57	28.17	4
67	Velká Polom (OV)	25.5.	86.70	22.07	4

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec (okres)	datum sběru	kontakt. lab. účinnost max. registr. dávky 7,5 g/ha (%)	kontakt. lab. účinnost dávky 1,5 g/ha (%)	stupeň rezistence populace dle IRAC (1 - 5)
68	Stará Ves n/O II (FM)	23.6.	88.90	32.83	4
69	Horní Těrlicko (KI)	23.6.	96.30	56.67	3
70	Vidnava (JE)	20.4.	50.00	26.67	4
71	Biskupice (PV)	23.4.	66.67	40.00	4
72	Brodek u Prostějova (PV)	24.4.	73.33	50.00	4
73	Lichkov (UO)	20.4.	56.67	43.33	4
74	Říčany u Prahy (PY)	11.5.	90.00	66.67	3
75	Česká Lípa (CL)	11.5.	43.33	26.67	5
76	Čestice (RK)	19.5.	63.33	43.33	4
77	Telnice (BO)	20.4.	100.00	66.67	2
78	Žatčany (BO)	20.4.	100.00	63.33	2
79	Měnin (BO)	20.4.	100.00	76.67	2
80	Blučina (BO)	20.4.	100.00	66.67	2
81	Žabčice (BO)	20.4.	100.00	60.00	2
82	Koválovice (BO)	23.4.	100.00	63.33	2
83	Dřevnovice (PV)	23.4.	100.00	56.67	2
84	Kojetín (PR)	23.4.	96.67	53.33	3

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010


číslo lokality	obec (okres)	datum sběru	kontakt. lab. účinnost max. registr. dávky 7,5 g/ha (%)	kontakt. lab. účinnost dávky 1,5 g/ha (%)	stupeň rezistence populace dle IRAC (1 - 5)
85	Němčice nad Hanou (PV)	29.4.	93.33	66.67	3
86	Dobromilice u Skale (PV)	29.4.	100.00	66.67	2
87	Stříbrnice (PR)	29.4.	100.00	40.00	2
88	Ivanovice na Hané (VY)	29.4.	93.33	43.33	3
89	Nezamyslice (PV)	29.4.	100.00	36.67	2
90	Blažovice (BO)	26.4.	100.00	100.00	1
91	Hodějice (VY)	26.4.	100.00	63.33	2
92	Nesovice (VY)	26.4.	100.00	26.67	2
93	Letonice (VY)	26.4.	90.00	30.00	3
94	Olešnice na Moravě (BK)	10.5.	100.00	36.67	2
95	Vnorovy (HO)	10.5.	100.00	86.67	2
96	Velká nad Veličkou (HO)	10.5.	100.00	33.33	2
97	Bystřice nad Perštejnem (ZR)	10.5.	100.00	46.67	2
98	Dolní Rožínka Rozsochy (ZR)	24.5.	100.00	96.67	2
99	Horní Rožínka (ZR)	24.5.	100.00	86.67	2
100	Písečné (ZR)	24.5.	100.00	96.67	2
101	Zvole u Bystřice (ZR)	24.5.	100.00	100.00	1

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec (okres)	datum sběru	kontakt. lab. účinnost max. registr. dávky 7,5 g/ha (%)	kontakt. lab. účinnost dávky 1,5 g/ha (%)	stupeň rezistence populace dle IRAC (1 - 5)
102	Velké Janovice (ZR)	1.6.	93.33	63.33	3
103	Pivonice (ZR)	1.6.	100.00	43.33	2
104	Domanínec (ZR)	1.6.	100.00	90.00	2
105	Věchov (ZR)	1.6.	80.00	63.33	4
106	Popovice (BO)	2.6.	100.00	63.33	2
107	Nové Město na Moravě (ZR)	13.6.	96.67	86.67	3
108	Ždár nad Sázavou (ZR)	13.6.	96.67	96.67	3
109	Bohdalec (ZR)	13.6.	100.00	93.33	2
110	Jamně (JI)	13.6.	100.00	100.00	1
111	Dolní Rozsíčka (ZR)	13.6.	100.00	86.67	2
112	Těšice (PR)	17.6.	60.00	40.00	4
113	Vyškov-Nouzka (VY)	18.6.	70.00	36.67	4
114	Pačlavice (KM)	23.6.	100.00	73.33	2
115	Měrovice (PR)	24.6.	100.00	100.00	1
116	Želeč (PV)	25.6.	100.00	70.00	2
117	Mořice (PV)	25.6.	100.00	90.00	2
118	Tasovice u Kunštátu (BK)	19.7.	96.67	76.67	3

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec (okres)	datum sběru	kontakt. lab. účinnost max. registr. dávky 7,5 g/ha (%)	kontakt. lab. účinnost dávky 1,5 g/ha (%)	stupeň rezistence populace dle IRAC (1 - 5)
119	Bystřice n/P (ZR)	19.7.	96.67	66.67	3
120	Rodkov (ZR)	19.7.	96.67	60.00	3
121	Ždánice (ZR)	19.7.	100.00	96.67	2
122	Kroměříž (KM)	20.4.	40.00	3.33	5
123	Roštění (KM)	1.7.	50.00	30.00	4
124	Vitonice (KM)	1.7.	33.33	0.00	5
125	Kostelec u Zlína (ZL)	1.7.	66.67	3.33	4



Obr. 2 - Geografické vyobrazení výsledků testování citlivosti blýskáčků na lambda-cyhalothrin v roce 2010: stupně rezistence (st. 1-5) byly jednotlivým populacím přiřazeny na základě IRAC kategorizace dle hodnot průměrné laboratorní účinnosti max. registrované (7,5 g ú.l./ha) a 5-násobně nižší dávky (použitá metoda *Adult vial test* IRAC č. 011 v.3). Barvy pro jednotlivé stupně rezistence: st. 1 = vysoce citlivá populace, **zelená** barva bodů; st. 2 = citlivá populace, **žlutá** barva bodů; st. 3 = středně rezistentní populace, **světle modrá** barva bodů; st. 4 = rezistentní populace, **tmavě modrá** barva bodů; st. 5 = vysoce rezistentní populace, **červená** barva bodů.

Z výsledků uvedených v tabulkách 1, 3 a na obr. 2 vyplývá, že situace na území ČR byla v roce 2010 jasně polarizovaná ve smyslu sever - jih. Severní polovina území státu byla víceméně obsazena populacemi rezistentními (= tmavě modré body) či vysoce rezistentními (= červené body). V jižní polovině republiky (jižní Morava a Čechy) byla situace podstatně lepší. Na jihu Čech tvořily podstatný podíl středně rezistentní (světle modré body) populace a na jihu Moravy převládaly populace citlivé (žluté body). To také vysvětluje vysokou variabilitu v dosažených účinnostech max. registrovanou dávkou (7,5 g ú.l./ha) u jednotlivých populací. U vysoce rezistentní populací se touto dávkou nedocílila ani 50% účinnost, naopak u vysoce citlivých i citlivých populací se touto dávkou dosáhlo 100% účinnosti (**graf 1**). A tak v roce 2010 mohli pěstitelé se stejnou dávkou pyretroidního přípravku docílit v polních podmínkách zcela odlišných výsledků na různých lokalitách. Účinnosti 20% dávky (5-násobně nižší dávka než dávka max. registrovaná = 1,5 g ú.l./ha) byly podle očekávání ještě více rozházené (variabilní) - 20% dávka působila na jednotlivé populace velmi rozdílně (**graf 2**). Rok 2010 lze označit za období zlomu k horšímu. Umožňuje nám to znalost vývoje, který následoval v dalších letech. Již v roce 2010 bylo možné v souboru nalézt populace, které nebyly plně citlivé ani na 5-násobek max. registrované dávky (37,5 g ú.l./ha, **graf 3**). Z dalšího vývoje (viz výsledky testování z let: 2011 - 2014) je zřejmé, že v následujících sezónách se začal zvyšovat podíl méně citlivých jedinců v jednotlivých populacích plošně na celém území ČR (viz mapy pro roky 2011 - 2014).

Tab. 4 - Výsledky testování citlivosti blýskáčků na lambda-cyhalothrin v roce 2010: odhady hodnot LD_{50} , LD_{90} a jejich intervalů spolehlivosti (slouží k posouzení statistické významnosti rozdílů mezi těmito hodnotami) pro jednotlivé populace; zároveň jsou v tabulce pro každou populaci vyjádřeny hodnoty resistance ratio (= RR, stanoveny jak pro LD_{50} tak pro LD_{90}) vztahující se jednak k nejnižším hodnotám LD_{50} či LD_{90} v dané kolekci (2010), za druhé k nejnižším hodnotám LD_{50} či LD_{90} za celou dobu testování (2009 - 2014). Nejnižší hodnoty LD_{50} a LD_{90} v kolekci 2010 jsou v příslušných sloupcích **zeleně** podsvíceny. **Tmavě červeně** jsou naopak podsvíceny nejvyšší ročníkové hodnoty LD_{50} a LD_{90} . Nejnižší hodnoty LD_{50} a LD_{90} zaznamenané za celou dobu monitoringu jsou tyto:

min hodnota $LD_{50(2009-2014)} = 0,05$ g ú.l./ha; hodnota zaznamenaná v kolekci z roku 2010

min hodnota $LD_{90(2009-2014)} = 0,60$ g ú.l./ha; hodnota zaznamenaná v kolekci z roku 2009

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec(okres)	LD ₅₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₅₀ 2010 = minLD ₅₀ 2009-2013)	LD ₉₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2010)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2009-2013)
1	Rapotín (SU)	46.78	16,892-577,082	917.25	3481.64	355,35-3198735,1	5726.38	5812.42
2	Postřelmov (SU)	7.09	3,991-14,344	139.08	129.26	47,4-895,3	212.59	215.79
3	Dubicko (SU)	4.96	3,138-8,049	97.33	40.37	21,091-119,492	66.40	67.40
4	Dolní Roveň Litětiny (PU)	7.84	2,752-45,007	153.78	432.09	63,578-432582,181	710.68	721.36
5	Přelouč Lhota (PU)	3.30	1,773-6,188	64.76	67.93	26,436-415,019	111.73	113.41
6	Úmonín (KH)	1.97	0,554-5,268	38.61	27.77	8,925-788,808	45.68	46.36
7	Litomyšl (SY)	4.11	2,750-6,159	80.61	21.98	13,111-50,725	36.16	36.70
8	Hůrka (CH)	7.01	3,317-17,468	137.53	32.97	14,186-316,162	54.23	55.04
9	Častolovice (RK)	5.12	3,203-8,310	100.41	23.94	13,479-67,787	39.38	39.97
10	Nekoř - Bredůvka (UO)	5.35	1,943-15,604	104.82	21.55	8,992-398,883	35.44	35.97
11	Rapotín II (SU)	1.82	1,035-3,013	35.69	20.98	10,579-67,301	34.51	35.03
12	Velký Týnec (OL)	3.23	1,519-7,006	63.24	40.86	15,426-337,397	67.21	68.22
13	Senice na Hané (OL)	4.99	2,639-10,407	97.75	76.87	28,525-565,058	126.43	128.33
14	Jezernice (PR)	3.99	2,003-8,355	78.16	24.70	11,020-136,378	40.62	41.23
15	Vyškov (VY)	1.68	0,704-3,394	32.86	38.27	13,975-340,306	62.94	63.88

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec(okres)	LD ₅₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₅₀ 2010 = minLD ₅₀ 2009-2013)	LD ₉₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2010)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2009-2013)
16	Slavoňov (SU)	8.62	3,336-42,843	168.94	1510.99	162,783-1932188,368	2485.18	2522.52
17	Dobruvice (MB)	5.71	2,438-16,319	112.00	130.98	35,171-3923,897	215.42	218.66
18	Turnov (SM)	12.67	5,115-59,028	248.51	337.10	67,787-82440,751	554.45	562.78
19	Dolní Černilov (HK)	6.06	3,027-10,615	118.75	28.58	15,070-133,930	47.00	47.71
20	Nymburk (NB)	1.48	0,548-3,011	28.92	55.36	18,854-595,494	91.05	92.42
21	Lánov u Vrchlabí (TU)	10.13	3,494-83,451	198.59	957.53	103,652-4803128,660	1574.89	1598.55
22	Jaroměřice n/R (TR)	0.72	0,158-1,647	14.12	8.87	3,457-112,404	14.59	14.81
23	Liberec (LB)	13.68	6,682-43,338	268.31	520.01	115,735-17580,847	855.27	868.12
24	Prostějov (PV)	1.50	0,740-2,700	29.49	28.95	12,497-140,834	47.62	48.33
25	Chomutov (CV)	10.08	4,546-33,445	197.61	142.29	40,007-4564,217	234.03	237.55
26	Javorník (JE)	4.88	2,684-9,524	95.71	99.35	36,905-670,519	163.40	165.85
27	Zlaté Hory (JE)	4.01	2,240-7,399	78.59	70.09	28,453-375,394	115.27	117.01
28	Želeč (TA)	3.26	1,481-7,289	63.98	158.56	42,755-3136,408	260.80	264.71
29	Třebohostice (ST)	0.07	0,000-0,237	1.35	1.18	0,439-6,068	1.93	1.96
30	Tismice (KO)	7.52	3,948-17,027	147.43	70.24	27,131-553,202	115.52	117.25
31	Sepekov (PI)	0.57	0,196-1,089	11.16	11.76	5,360-55,601	19.34	19.63

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec(okres)	LD ₅₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₅₀ 2010 = minLD ₅₀ 2009-2013)	LD ₉₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2010)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2009-2013)
32	Staňkov (DO)	0.37	0,118-0,689	7.31	3.59	1,892-12,825	5.91	5.99
33	Pluhův Žďár (JH)	1.75	1,250-2,406	34.37	5.64	3,876-10,213	9.27	9.41
34	Chvalkovice (NB)	9.26	5,991-15,202	181.59	24.17	14,826-76,706	39.75	40.34
35	Krč (PI)	1.16	0,733-1,749	22.65	6.65	3,927-16,026	10.94	11.10
36	Hrejkovice (PI)	0.05	0,000-0,205	1.00	1.62	0,613-8,557	2.66	2.70
37	Kasejovice (PJ)	0.21	0,025-0,529	4.14	6.37	2,790-35,977	10.48	10.63
38	Kestrňany (PI)	0.91	0,602-1,332	17.88	3.95	2,475-8,722	6.49	6.59
39	Kladruby (RO)	0.36	0,099-0,697	7.12	3.47	1,785-13,554	5.70	5.79
40	Kluky u Písku (PI)	0.08	0,010-0,346	1.61	0.73	0,531-1,321	1.20	1.22
41	Bor u Tachova (TC)	2.02	1,136-3,425	39.63	26.26	12,488-98,354	43.19	43.84
42	Mrákov (DO)	1.03	0,441-1,874	20.10	18.03	8,113-84,463	29.66	30.11
43	Munice (CB)	0.79	0,316-1,479	15.57	6.52	3,199-27,709	10.72	10.88
44	Nebovidy (KO)	4.79	2,524-8,910	93.88	20.38	10,553-82,577	33.51	34.02
45	Neveklov (BN)	0.60	0,177-1,212	11.69	17.92	7,396-112,602	29.47	29.91
46	Nová Včelnice (JH)	0.43	0,037-1,068	8.41	5.59	2,126-119,588	9.19	9.32
47	Ovčiny (BN)	0.79	0,298-1,498	15.51	15.99	7,131-77,368	26.30	26.69
48	Hostěradice (ZN)	4.65	2,699-8,065	91.14	38.71	19,013-138,999	63.67	64.62

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec(okres)	LD ₅₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₅₀ 2010 = minLD ₅₀ 2009-2013)	LD ₉₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2010)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2009-2013)
49	Jezeřany (ZN)	2.34	0,678-5,152	45.82	11.39	5,164-96,315	18.73	19.02
50	Našiměřice (ZN)	2.33	1,44-3,650	45.67	17.94	10,007-45,815	29.50	29.94
51	Znojmo (ZN)	4.77	3,103-7,396	93.61	30.90	17,469-78,261	50.83	51.59
52	Troubsko I (BO)	6.19	3,432-11,515	121.35	75.28	32,131-393,678	123.81	125.67
53	Trousco II (BO)	1.78	1,074-2,899	34.88	6.75	3,909-19,413	11.10	11.26
54	Třebíč (TR)	0.72	0,158-1,647	14.12	8.87	3,457-112,404	14.59	14.81
55	Kralice nad Oslavou (TR)	1.40	0,605-2,835	27.45	5.58	2,768-31,341	9.17	9.31
56	Telč (JI)	2.13	1,082-4,582	41.75	8.01	3,901-48,319	13.17	13.37
57	Zakřany (BO)	1.28	0,895-1,808	25.00	4.38	2,880-8,816	7.20	7.31
58	Opava Kylešovice I (OP)	3.35	2,517-4,470	65.76	7.49	5,461-12,531	12.32	12.50
59	Opava Kylešovice II (OP)	2.55	1,283-5,637	49.98	8.65	4,256-52,727	14.22	14.44
60	Hodslavice (NJ)	2.99	1,680-5,271	58.65	24.69	12,102-88,409	40.61	41.22
61	Výškovice u Bílovce (NJ)	20.18	9,573-79,386	395.61	810.57	156,948-53460,580	1333.18	1353.21
62	Zubří (ZR)	3.43	1,269-8,349	67.18	36.36	13,216-465,940	59.80	60.70
63	Příbor (NJ)	0.75	0,150-1,769	14.67	14.58	5,186-239,028	23.99	24.35
64	Stará Ves n/O. (FM)	3.00	0,638-12,415	58.84	139.51	24,620-239041,508	229.46	232.91

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010

číslo lokality	obec(okres)	LD ₅₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₅₀ 2010 = minLD ₅₀ 2009-2013)	LD ₉₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2010)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2009-2013)
65	Klimkovice (OV)	8.35	4,198-19,215	163.78	71.03	27,839-552,311	116.83	118.58
66	Sviadnov (FM)	3.24	2,018-5,032	63.55	24.35	13,567-65,034	40.06	40.66
67	Velká Polom (OV)	3.27	1,499-5,991	64.14	12.40	6,637-54,897	20.40	20.70
68	Stará Ves n/O II (FM)	2.18	0,954-3,666	42.78	7.68	4,440-29,404	12.63	12.82
69	Horní Těrlicko (KI)	0.85	0,175-2,064	16.75	5.57	2,258-106,883	9.15	9.29
70	Vidnava (JE)	7.48	4,375-14,181	146.69	105.45	42,876-566,648	173.44	176.05
71	Biskupice (PV)	1.89	0,842-3,691	36.98	61.25	21,578-533,289	100.74	102.26
72	Brodek u Prostějova (PV)	1.02	0,456-1,837	19.98	19.28	8,626-89,728	31.72	32.19
73	Lichkov (UO)	3.35	1,743-6,456	65.76	48.82	19,802-290,888	80.29	81.50
74	Říčany u Prahy (PY)	0.23	0,029-0,575	4.51	9.91	4,024-74,637	16.29	16.54
75	Česká Lípa (CL)	14.44	6,039-75,112	283.08	1374.77	180,177-442189,343	2261.13	2295.11
76	Čestice (RK)	1.96	0,788-4,122	38.47	95.67	28,462-1491,424	157.35	159.71
77	Telnice (BO)	0.96	0,690-1,348	18.90	2.91	1,957-5,856	4.79	4.86
78	Žatčany (BO)	0.42	0,176-0,713	8.24	3.74	2,050-11,973	6.15	6.25
79	Měnín (BO)	0.17	0,004-0,442	3.35	2.25	0,975-24,919	3.69	3.75
80	Blučina (BO)	0.21	0,041-0,436	4.20	2.62	1,367-9,990	4.30	4.37
81	Žabčice (BO)	0.70	0,430-1,048	13.71	3.58	2,153-8,970	5.88	5.97

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010


číslo lokality	obec(okres)	LD ₅₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₅₀ 2010 = minLD ₅₀ 2009-2013)	LD ₉₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2010)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2009-2013)
82	Koválovice (BO)	0.53	0,281-0,829	10.37	3.36	1,952-9,362	5.53	5.61
83	Dřevnovice (PV)	0.99	0,642-1,561	19.47	3.87	2,285-10,859	6.37	6.46
84	Kojetín (PR)	0.67	0,344-1,090	13.12	5.85	3,192-17,453	9.62	9.76
85	Němčice nad Hanou (PV)	0.96	0,613-1,430	18.84	4.84	2,961-11,048	7.97	8.09
86	Dobromilice u Skale (PV)	0.36	0,131-0,626	7.00	3.38	1,840-11,254	5.57	5.65
87	Stříbrnice (PR)	1.32	0,824-2,118	25.86	6.22	3,520-17,770	10.23	10.39
88	Ivanovice na Hané (VY)	0.84	0,477-1,324	16.45	6.29	3,543-17,043	10.35	10.50
89	Nezamyslice (PV)	1.13	0,586-2,089	22.10	5.70	2,858-26,982	9.38	9.52
90	Blažovice (BO)	0.28	0,163-0,385	5.51	0.78	0,560-1,406	1.27	1.29
91	Hodějice (VY)	0.49	0,240-0,777	9.51	3.38	1,931-9,794	5.56	5.64
92	Nesovice (VY)	1.63	0,694-4,350	31.90	6.37	2,806-92,975	10.48	10.63
93	Letonice (VY)	1.98	1,005-3,979	38.90	9.07	4,407-46,794	14.91	15.14
94	Olešnice na Moravě (BK)	0.96	0,521-1,644	18.78	5.14	2,711-19,416	8.45	8.58
95	Vnorovy (HO)	0.18	0,039-0,317	3.61	1.04	0,626-3,798	1.71	1.73
96	Velká nad Veličkou (HO)	1.66	1,013-2,865	32.53	5.12	2,944-17,707	8.42	8.55
97	Bystřice nad Perštejnem (ZR)	0.96	0,457-1,819	18.78	5.14	2,510-28,506	8.45	8.58
98	Dolní Rožínka Rozsochy	0.21	0,056-0,320	4.04	0.82	0,530-3,000	1.35	1.37

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010


číslo lokality	obec(okres)	LD ₅₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₅₀ 2010 = minLD ₅₀ 2009-2013)	LD ₉₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2010)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2009-2013)
	(ZR)							
99	Horní Rožínka (ZR)	0.16	0,025-0,305	3.14	1.21	0,693-4,417	1.99	2.02
100	Písečné (ZR)	0.19	0,038-0,298	3.63	0.79	0,503-2,932	1.29	1.31
101	Zvole u Bystřice (ZR)	0.08	0,011-0,272	1.51	0.63	0,423-1,321	1.04	1.05
102	Velké Janovice (ZR)	0.42	0,144-0,774	8.20	5.84	2,954-21,623	9.61	9.76
103	Pivonice (ZR)	0.76	0,450-1,161	14.82	4.62	2,684-12,238	7.60	7.72
104	Domaníněk (ZR)	0.31	0,137-0,472	6.00	1.39	0,866-3,926	2.29	2.33
105	Věchov (ZR)	0.37	0,134-0,664	7.27	3.94	2,105-13,054	6.47	6.57
106	Popovice (BO)	0.70	0,376-1,144	13.71	3.58	1,984-12,222	5.88	5.97
107	Nové Město na Moravě (ZR)	0.25	0,071-0,466	4.94	2.27	1,254-7,214	3.73	3.78
108	Ždár nad Sázavou (ZR)	0.16	0,025-0,266	3.04	0.63	0,407-1,480	1.04	1.06
109	Bohdalec (ZR)	0.30	0,146-0,449	5.92	1.16	0,744-3,158	1.90	1.93
110	Jamné (JI)	0.06	0,005-0,268	1.24	0.61	0,386-1,283	1.00	1.02
111	Dolní Rozsíčka (ZR)	0.17	0,024-0,313	3.31	1.00	0,585-3,631	1.64	1.67
112	Těšice (PR)	1.72	0,890-3,040	33.69	29.87	13,084-139,394	49.13	49.87
113	Vyškov-Nouzka (VY)	1.81	0,835-3,691	35.53	15.77	6,767-98,863	25.94	26.33
114	Pačlavice (KM)	0.17	0,023-0,375	3.35	2.25	1,156-8,936	3.69	3.75

Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2010


číslo lokality	obec(okres)	LD ₅₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₅₀ 2010 = minLD ₅₀ 2009-2013)	LD ₉₀ (g ú.l./ha)	CI (0,95)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2010)	Resistance ratio (minLD ₉₀ 2009-2013)
115	Měrovice (PR)	0.08	0,008-0,320	1.63	0.71	0,495-1,410	1.16	1.18
116	Želeč (PV)	0.26	0,067-0,503	5.14	2.99	1,581-10,954	4.92	5.00
117	Mořice (PV)	0.31	0,137-0,472	6.00	1.39	0,866-3,926	2.29	2.33
118	Tasovice u Kunštátu (BK)	0.33	0,115-0,594	6.51	3.23	1,759-10,379	5.31	5.39
119	Bystřice n/P (ZR)	0.59	0,307-0,936	11.51	4.25	2,421-11,799	7.00	7.10
120	Rodkov (ZR)	0.44	0,172-0,787	8.69	5.15	2,689-17,743	8.47	8.60
121	Ždánice (ZR)	0.41	0,291-0,556	7.98	1.01	0,706-2,149	1.66	1.69
122	Kroměříž (KM)	9.25	6,540-13,198	181.43	31.20	20,545-64,832	51.31	52.09
123	Roštění (KM)	3.57	1,771-7,561	69.92	34.91	14,054-248,377	57.42	58.29
124	Vitonice (KM)	10.28	7,625-13,975	201.47	24.81	17,454-48,257	40.81	41.42
125	Kostelec u Zlína (ZL)	5.48	4,027-7,377	107.35	13.22	9,391-24,956	21.74	22.06




Graf 1 - Srovnání hodnot laboratorních účinnosti dosažených u jednotlivých populací blýskáčků maximální registrovanou dávkou lambda-cyhalothrinu do řepky ozimé v ČR ($7,5 \text{ g} \cdot \text{ha}^{-1}$). Čísla populací uvedených v grafu (osa x) odpovídají číslům populací v tabulkách 3a 4 a na obr. 1. Použitá metoda testování: *Adult vial test* IRAC 011 version 3 (2010, 125 populací otestováno).



Graf 2 - Srovnání hodnot laboratorních účinnosti dosažených u jednotlivých populací blýskáčků 20% dávkou lambda-cyhalothrinu (= dávka 5-násobně nižší než max. registrovaná dávka: 1,5 g.ha⁻¹). Čísla populací uvedených v grafu (osa x) odpovídají číslům populací v tabulkách 3a 4 a na obr. 1. Použitá metoda testování: *Adult vial test* IRAC 011 version 3 (2010, 125 populací otestováno).



Graf 3 - Srovnání hodnot laboratorních účinnosti dosažených u jednotlivých populací blýskáček 500% dávkou lambda-cyhalothrinu (= dávka 5-násobně vyšší než max. registrovaná dávka: 37,5 g.ha⁻¹). Čísla populací uvedených v grafu (osa x) odpovídají číslům populací v tabulkách 3a 4 a na obr. 1. Použitá metoda testování: *Adult vial test* IRAC 011 version 3 (2010, 125 populací otestováno).




Graf 4 - Srovnání hodnot LD₅₀ (g ú.l./ha) pro lambda-cyhalothrin odhadnutých (probitová regrese) pro testované populace blýskáčků v roce 2010. Červená čára vymezuje maximální registrovanou dávku pro lambda-cyhalothrin v řepce ozimé v ČR (7,5 g ú.l./ha). Čísla populací uvedených v grafu (osa x) odpovídají číslům populací v tabulkách 3a 4 a na obr. 1. Použitá metoda testování: *Adult vial test* IRAC 011 version 3 (2010, 125 populací otestováno).


V roce 2010 byla hodnota LD₅₀ průměrné české populace blýskáčků 3,15 g ú.l./ha. Průměrná hodnota je vzhledem k variabilitě dat dost zkreslující pojem, značně ovlivněný přítomností extrémů. V souboru se nacházely populace s hodnotami LD₅₀ výrazně pod hranicí max. registrované dávky (= 7,5 g ú.l./ha), těchto populací bylo v roce 2010 ještě většina, tak i populace s hodnotami LD₅₀ více či méně výrazně nad hranicí max. registrované dávky pro lambda-cyhalothrin. Hodnoty LD₉₀ byly u vysokého podílu populací na hranici resp. nad hranicí (v některých případech výrazně) vymezenou hodnotou max. registrovanou dávkou (graf 5).

Velmi negativní trend vyplývá ze srovnání hodnot RR LD₅₀ (a také RR LD₉₀). Hodnota RR LD₅₀ vyjadřuje, kolikrát je konkrétní populace (= každé jednotlivé modré kolečko v grafu 6) méně citlivá k lambda-cyhalothrinu v porovnání s populací nejcitlivější (= populace s nejnižší

hodnotou LD_{50} za celou dobu monitoringu: 0,051 g ú.l./ha). Jak vyplývá z dosavadního vývoje hodnot RR (tab. 4 a graf 6), rezistence českých populací k lambda-cyhalothrinu (a potažmo ke všem esterickým pyretroidům) zatím v průběhu času (2008 - 2014) stále rostla. Dochází-li k růstu podílu populací s hodnotami RR LD_{50} nad 30, signalizuje to intenzivní selekci rezistentních populací na úkor citlivých na daném území, což je pro ČR již několik let charakteristické.



Graf 5 - Srovnání hodnot LD_{90} (g ú.l./ha) pro lambda-cyhalothrin odhadnutých (probitová regrese) pro testované populace blýskáčků v roce 2010. Červená čára vymezuje opět maximální registrovanou dávku pro lambda-cyhalothrin v řepce ozimé v ČR (7,5 g ú.l./ha). Čísla populací uvedených v grafu (osa x) odpovídají číslům populací v tabulkách 3a 4 a na obr. 1. Použitá metoda testování: *Adult vial test* IRAC 011 version 3 (2010, 125 populací otestováno). Poznámka: ze souboru zobrazovaném v grafu vyřazeno 7 populací (č. 1, 4, 16, 21, 23, 61 a 75) s hodnotami LD_{90} nad 400. Důvod vyloučení těchto hodnot (a populací) z grafu bylo zachování sdělnosti grafu - cílem je ukázat, jaký podíl populací má hodnoty LD_{90} nad hodnotou max. registrované dávky.



Graf 6 - Srovnání jednotlivých ročníkových kolekcí (2009 - 2014) populací blýskáčků (jednotlivé populace = modrá kolečka) z hlediska postupného růstu podílu necitlivých či extrémně necitlivých populací (vysoké hodnoty RR LD₅₀) k lambda-cyhalothrinu v nich.

II.2.1. Elektronická mapa s odborným obsahem


Elektronická mapa je geografickým vyjádřením výsledků předkládaných a interpretovaných v části II tohoto dokumentu. Elektronická mapa (Google aplikace) je volně přístupná (bezplatně) na těchto adresách:

- Na adresách organizací řešitelského týmu: <http://www.agritec.cz> a <http://www.vupt.cz>.
- Na adrese smluvního uživatele výsledků projektu NAZV č. QJ1230077: <http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/>.
- Link na mapu Lambda-cyhalothrin-blýskáček-2010: [mapa google](#)

Postup při otevírání a práci s údaji na elektronické mapě:


- 1) Zvolit výše uvedenou www stránku, např.: <http://www.agritec.cz>.
- 2) Zde vybrat a zvolit vhodnou mapu, v tomto případě: **Lambda-cyhalothrin; blýskáček; 2010, mapa resistance** (je více map: při výběru se řídí druhem testované insekticidní účinné látky a druhem testovaného hmyzu a rokem testování).
- 3) Po otevření mapy si prostudovat legendu vlevo od vlastní mapy (zde jsou uvedeny některé důležité údaje nutné pro správné pochopení údajů na mapě prezentovaných).
- 4) Na mapě je možné měnit pomocí myši měřítko mapy (přibližovat, oddalovat).
- 5) Pomocí myši označit zájmovou lokalitu (= lokalitu, ze které byl v roce 2010 odebrán sběr blýskáčků otestovaných na lambda-cyhalothrin metodou IRAC 011 v.3) a kliknout.
- 6) Prostudovat si údaje, které se objeví v rámečku (údaje se vztahují k populaci odebrané z této lokality).

Ukázka práce s elektronickou mapou:



Obr. 3 - Na mapě (server Google) jsou vyznačeny lokality, ze kterých byly odebrány vzorky populací blýskáčků testovaných na citlivost proti lambda-cyhalothrinu v roce 2010. Barva bodů přiřazeným stupňům rezistence (st. 1–5) dle metodiky IRAC č. 011 version 3. Červené body označují populace vysoce rezistentní (st. 5), tmavě modré body populace rezistentní (st.

4), světle modré body populace středně rezistentní (st. 3), žluté body populace citlivé (st. 2), zelené body populace vysoce citlivé (st. 1). V levé, textové části, se nachází legenda k mapě. Po rychlém přehlédnutí mapy je zřejmé, že v roce 2010 na území ČR převládaly rezistentní (st. 4; tmavě modré body) a středně rezistentní (st. 3; světle modré body) populace na lambda-cyhalothrin.



Obr. 4 - Po kliknutí myši na ikonu lokality se zobrazí několik základních informací o konkrétní testované populaci: uvedena je kontaktní laboratorní účinnost dosažená dávkou odpovídající maximální registrované dávce lambda-cyhalothrinu do řepky ozimé v ČR (%), vyjádřené dle Abbotta), přiřazený stupeň rezistence dle IRAC (st. 1–5) a hodnoty letálních dávek LD₅₀ a LD₉₀ a LD_{99,99} (g ú.l./ha) odhadované pro testovanou účinnou látku. V tomto případě došlo k zobrazení údajů k vysoce citlivé populaci (st. 1; zelený bod) odebrané na lokalitě Zvole. V případě této populace, by registrovaná dávka lambda-cyhalothrinu (5 g ú.l./ha) působila v polních podmínkách spolehlivě. Přesněji řečeno, účinnost aplikace by nebyla negativně ovlivněna získanou rezistencí blýskáčků k tomuto insekticidu. Je ale třeba si uvědomit, že to platí pro rok 2010. Pro novější informace je nutné přejít k aktuálním výsledkům monitoringu.

II.3. Shrnutí výsledků testování provedených v roce 2010 a praktická doporučení (aktualizovaná dle nejnověji získaných výsledků - 2014)

Testování citlivosti blýskáčků na účinnou látku lambda-cyhalothrin dle metodiky IRAC č. 011 verze 3 (lahvičkový test) probíhá v rámci projektů QH 81218 (2008–2012) a QJ1230077 (2012–2016) od roku 2008. Po prostudování výsledků uvedených v tomto

dokumentu a na elektronické mapě pro rok 2010 (**Lambda-cyhalothrin; blýskáček; 2010, mapa rezistence**) je také možné provést jejich srovnání s výsledky z jiných let testování a udělat si představu o vývoji situace. Všechny mapy a doprovodné dokumenty k nim jsou volně dostupné na stejných internetových adresách, zejména na <http://www.agritec.cz>.

Praktická doporučení (jsou vždy aktualizovány dle nejnověji získaných výsledků; zde aktualizace na základě výsledků z roku 2014):

- 1) Prakticky již u všech českých populací (roky 2013 a 2014) se hodnoty LD₉₀ pro lambda-cyhalothrin pohybují nad úrovní maximální registrované dávky (7,5 g ú.l./ha). V řadě případů jde o velmi výrazné překročení této hodnoty. Z toho vyplývá, že v ČR je nemožné v polních podmínkách na blýskáčky dosáhnout běžně používanou polní dávkou lambda-cyhalothrinu uspokojivou účinnost (90 a více %).
- 2) Vzhledem ke zjištěným výsledkům zejména v letech 2013 a 2014 by měly být esterické pyretroidy (u nás registrovány tyto látky: lambda-cyhalothrin, cypermethrin, alpha-cypermethrin, zeta-cypermethrin, beta-cyfluthrin, gamma-cyhalothrin, esfenvalerate) z dalšího využívání v ochraně proti blýskáčkům v řepce ozimé zcela vyloučeny. Ochrana musí být založena na látkách s odlišným mechanismem účinku. K ochraně porostů řepky olejky napadených blýskáčky doporučujeme využít zejména pymetrozine, indoxacarb či některý ze tří registrovaných organofosfátů. Na základě výsledků polních pokusů lze s jistotou opatrností doporučit i etherický pyretroid etofenprox. Na základě výsledků testování nedoporučujeme neonikotinoidy jako vhodnou alternativu za selhávající esterické pyretroidy.
- 3) Je potřeba neaplikovat insekticidy jakýchkoliv forem zbytečně. Insekticidní postřik by měl být proveden jen u porostů napadených nadprahově. Doporučujeme využít spíše německý model prahových hodnot (tab. 5).
- 4) Důsledné dodržování antirezistentních strategií je nezbytné v celé ČR.

Tab. 5 - Prahy škodlivosti pro blýskáčka řepkového pro ČR (zdroj: Kolektiv autorů (2013): Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům: polní plodiny. 1. vyd. Praha: Česká společnost rostlinolékařská, 2013. 360 s. ISBN 978-80-02-02480-4) a některé další evropské země (zdroj: EPPO Bulletin, 2008).

Stát	hodnota prahu škodlivosti (počet brouků / vrcholové květenství)	Růstová fáze plodiny, ke které se prahová hodnota vztahuje:
ČR	1	poupata uzavřená, zelená, květenství z vrchu již viditelné (BBCH 51)
	3	krátce před květem (BBCH 55 - 57)

Německo	3 - 4*	poupata uzavřená, zelená, květenství z vrchu krytá listy (BBCH 50)
	7 - 8*	BBCH 51 - 52
	9 - 10*	BBCH 53 - 59
Rakousko	1 – 3 ve vnitřních částech pole; 4 – 5 na okrajích pozemku	BBCH 50

*u stresovaných a zpožděných porostů se doporučuje ošetřit i při nižším výskytu

III. Vyjádření se k novosti postupů

Tato mapa je zcela nová, nejedná se tedy o korekci či rozvinutí nějaké starší studie. Veškerá zde publikovaná data vznikla výzkumnou činností v letech 2010 až 2014. Výsledky byly získány při řešení projektu NAZV MZe ČR č. QJ1230077.

IV. Závěr

V průběhu monitoringu (2008–2014) citlivosti českých populací blýskáčků k lambda-cyhalothrinu došlo k výraznému zhoršení situace v roce 2012. Od roku 2013 mezi českými populacemi zcela predominují rezistentní a vysoce rezistentní populace. Při srovnání stavu zaznamenaného v letech 2013 a 2014 se stavem zaznamenaným v roce 2010 lze konstatovat, že v roce 2010 byla citlivost řady populací blýskáčků k lambda-cyhalothrinu ještě relativně vysoká (citlivé a vysoce citlivé populace, viz zejména obr. 2). Za současného stavu (jaro 2015) ale platí, že bude-li na populace blýskáčků v ČR dále vyvíjen silný selekční tlak esterickými pyretroidy, tedy budou-li k ochranným zásahům proti tomuto druhu nadále využívány tyto insekticidy, podíl necitlivých jedinců v populacích se ještě zvýší, což se projeví dalším poklesem polní účinnosti registrovaných dávek u všech látek z této skupiny (křížová rezistence). Týká se to i pyretroidů, které jsou registrovány ve výrazně vyšší dávce než lambda-cyhalothrin (jedná se o cypermethrin registrovaný v dávce: 25 g ú.l./ha). Je nezbytné dodržovat antirezistentní strategie v celé ČR. Též je nutné v praxi stavět na principech integrované ochrany rostlin.

V. Oponenti předkládané mapy s odborným obsahem

- 1) Ing. Jakub Beránek Ph.D.; ÚKZÚZ, oddělení metod integrované ochrany rostlin (telefon: 545 110 456, e-mail: jakub.beranek@ukzuz.cz); Zemědělská 1752/1a, Brno, 613 00).

- 2) Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra ochrany rostlin
(telefon: +420 224 382 590, e-mail: kazda@af.czu.cz); Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 -
Suchdol).

VI. Literatura

- Abbott, W. S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. *J. Econ. Entomol.*, **18**: 265–267.
- Metcalf, R.,L., Müller F. (2000): Insecticides. In: *Agrochemicals* (Ed. MüllerF), pp. 495–631. Wiley-VCH, Weinheim.
- Moore, G., D. (2010): Characterising metabolic resistance in pyrethroids-insensitive pollen beetle (*Meligethes aeneus* F.) from Poland and Switzerland. *Pest. Manag. Sci.*, **67**: 239–243.
- Nauen, R (2009): Rapsglanzkäfer: neue dimension in der insektizidresistenz, RAPS 2, 70.
- Philippou, D., Field, L., M., Wegorek, P., Zamojska, J., Andrews, M., C., Slater, R. & Moore, G., D. (2010): Characterising metabolic resistance in pyrethroids-insensitive pollen beetle (*Meligethes aeneus* F.) from Poland and Switzerland. *Pest. Manag. Sci.*, **67**: 239–243.
- Slater, R., Ellis S., Genay, J. P., Heimbach, U., Huart., G., Sarazin, M., Longhurst, C., Müller, A., Nauen, R., Rison, J. L., Robin, F. (2011): Pyrethroid resistance monitoring in European populations of pollen beetle (*Meligethes* spp.): a coordinated approach through the Insecticide Resistance Action Committee (IRAC). *Pest. Manag. Sci.*, **67**(6): 633–638.
- Wegorek, P. (2005): Preliminary data on resistance appearance of pollen beetle PB (*Meligethes aeneus* F.) to selected pyrethroids, organophosphorous and chloronicotynyls insecticides, in 2004 year, in Poland. *Resistant. Pest Manag. Newslett.*, **14**: 10–12.
- Wegorek, P., Obrepalska-Stepłowska, A., Zamojska, J., Nowaczyk, K. (2006): Resistance of pollen beetle (*Meligethes aeneus* F.) in Poland. *Resistant. Pest Manag. Newslett.*, **16**: 28–29.
- Wegorek, P & Zamojska, J. (2008): Current status of resistance in pollen beetle (*Meligethes aeneus* F.) to selective active substance of insecticides in Poland. *EPPO Bulletin*, **38**: 91–94.
- Wegorek, P., Mrówczyński, M., Zamojska, J. (2009): Resistance of pollen beetle (*Meligethes aeneus* F.) to selected active substances of insecticides in Poland. *Journal of Plant Protection Research*, **49**(1): 131–139.
- Zimmer, CH., T. & Nauen, R. (2011a): Pyrethroid resistance and thiacloprid baseline susceptibility of European populations of *Meligethes aeneus* (*Coleoptera: Nitidulidae*) collected in winter oilseed rape. *Pest. Manag. Sci.*, **67**: 599–608.

Zimmer, CH., T. & Nauen, R. (2011b): Cytochrome P450 mediated pyrethroids resistance in European populations of *Meligethes aeneus* (Coleoptera: Nitidulidae). *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 100: 264–272.

Citace webových zdrojů:

Originál metodiky Met 011 verze 3: http://www.irac-online.org/wp-content/uploads/2009/09/Method_011_v3_june09.pdf

Pollen Beetle Resistance Monitoring. [Online]. IRAC Pollen Beetle Working Group (2008): Available: [http://www.irac-online.org/documents\[14March2009\]](http://www.irac-online.org/documents[14March2009])

VII. Seznam publikací, které předcházely mapě s odborným obsahem

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., HRUDOVÁ, E. (2012): Stonkovi krytonosci a antirezistentní strategie proti blýskáčkům. *Úroda*, Vol. 60, č. 2, s. 48–53. ISSN 0139-6013

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HAVEL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., BERNARDOVÁ, M. a kol., SPITZER, T. (2012): Co je příčinou nižší citlivosti blýskáčka řepkového (*Meligethes aeneus*) na pyretroidy. *Úroda-příloha Řepka*, 60(4): 31–35. ISSN 0139-6013

SEIDENGLANZ, M., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HAVEL, J., SPITZER, T., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., BERNARDOVÁ, M., a kol. (2012): Škůdci řepky ozimé na jaře. *Farmář*, Vol. 18, No. 5, 28–30. ISSN 1210-9789

HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P.: Species spectrum of pollen beetles on oil plants. *Proceedings of abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference: 5.9.–7.9. 2012, Nitra, Slovensko: Slovenská poľnohospodárska univerzita*, 2012, 62–63, ISBN 978-80-552-0838-1

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., BERNARDOVÁ, M. and her cooperators, HAVEL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HERDA, G.: Correlation between the susceptibility of *Meligethes aeneus* (Coleoptera; Nitidulidae) to chlorpyrifos-ethyl and lambda-cyhalothrin in the Czech Republic and Slovakia. In: *Proceedings of abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference: 5.9.–7.9. 2012, Nitra, Slovensko: Slovenská poľnohospodárska univerzita*, 2012, 72–73, ISBN 978-80-552-0838-1

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M. a kol., HERDA, G., ŠUBR, J. (2012): Vývoj citlivosti blýskáčků proti pyretroidům mezi lety 2008–2012, korelace mezi účinností jednotlivých insekticidů a první výsledky testování citlivosti krytonosců šesulových,

krytonosců čtyřzubých a dřepčků rodu *Phyllotreta* na pyretroidy. In: Sborník příspěvků z konference Hluk : 21.11.–22.11. 2012, Hluk: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2012, s. 175–181, ISBN 978-80-87065-43-3

TÓTH, P., HRUDOVÁ, E., SAPÁKOVÁ, E., ZÁVADSKÁ, E., SEIDENGLANZ, M. (2013): Pollen beetle (*Meligethes* spp.) species occurring in oil-seed rape fields in the Czech Republic. *Plant Protect. Sci.*, Vol. 49, No. 4, 187–196. ISSN 1212-2580

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., BERNARDOVÁ, M., SPITZER, T., BÍLOVSKÝ, J. Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2011. 1. vydání. Šumperk: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., 2013. 33 s. ISBN 978-80-87360-21-7

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., BERNARDOVÁ, M., SPITZER, T., BÍLOVSKÝ, J. Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2012. 1. vydání. Šumperk: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., 2013. 34 s. ISBN 978-80-87360-22-4

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., BERNARDOVÁ, M. Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2012. 1. vydání. Šumperk: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., 2013. 33 s. ISBN 978-80-87360-23-1

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., BERNARDOVÁ, M. Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2012. 1. vydání. Šumperk: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., 2013. 31 s. ISBN 978-80-87360-24-8

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., BERNARDOVÁ, M. Mapa s odborným obsahem: Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v roce 2012. 1. vydání. Šumperk: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., 2013. 36 s. ISBN 978-80-87360-25-5

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., SPITZER, T., BÍLOVSKÝ, J. Metodika ochrany porostů řepky ozimé (*Brassica napus* L.) proti krytonosci čtyřzubému (*Ceutorhynchus pallidactylus*, Marsham. 1802). 1. vydání. Šumperk: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., 2013. 39 s. ISBN 978-80-87360-20-0.

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., (2013): Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v roce zásevu. *Agromanuál*, Vol. 8, No. 08, 32 – 36. ISSN 1801 - 7673

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J., HRUDOVÁ, E. (2013) First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (*Meligethes aeneus*, Fabricius 1775) in the Czech Republic. *IOBC-WPRS Bulletin*, Vol. 92, pp. 67 - 76.

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HAVEL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., BERNARDOVÁ, M. a kol. (2014): Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům. *Úroda*, Vol. 62, No. 2, 42 – 46. ISSN 0139-6013.

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HAVEL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., BERNARDOVÁ, M. a kol. (2014): Citlivost škodcov repky k insekticidom. *Naše pole*, Vol. XVIII, č. 5, s. 43 – 45. ISSN 1335-2466.

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., BERNARDOVÁ, M. Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013: mapa s odborným obsahem [online]. 1. vyd. Šumperk: AGRITEC, 2014. 33 s. ISBN 978-80-87360-26-2. Dostupné z www.agritec.cz

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., BERNARDOVÁ, M. Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013: mapa s odborným obsahem [online]. 1. vyd. Šumperk: AGRITEC, 2014. 33 s. ISBN 978-80-87360-27-9. Dostupné z www.agritec.cz

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., BERNARDOVÁ, M. Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013: mapa s odborným obsahem [online]. 1. vyd. Šumperk: AGRITEC, 2014. 34 s. ISBN 978-80-87360-28-6. Dostupné z www.agritec.cz

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., BERNARDOVÁ, M. Výsledky testování citlivosti blýskáčků (*Meligethes* spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v roce 2013: mapa s odborným obsahem [online]. 1. vyd. Šumperk: AGRITEC, 2014. 36 s. ISBN 978-80-87360-29-3. Dostupné z www.agritec.cz

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., BERNARDOVÁ, M. Výsledky testování citlivosti krytonosce šesulového (*Ceutorhynchus obstrictus*) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013: mapa s odborným obsahem [online]. 1. vyd. Šumperk: AGRITEC, 2014. 31 s. ISBN 978-80-87360-30-9. Dostupné z www.agritec.cz

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HAVEL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M. (2014): Škůdci řepky a jejich citlivost na insekticidy. *Farmář*, Vol. 20, No. 6, 36-37. ISSN 1210-9789

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HAVEL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., BERNARDOVÁ, M. a kol., SPITZER, T. (2014): Změny v citlivosti blýskáčků v řepce na insekticidy (pyretroidy, organofosfáty, neonikotinoidy) v ČR (2009 - 2014). Sborník příspěvků z konference Hluk: 19.11. – 20.11. 2014, Hluk: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2014, s. 149 - 153, ISBN 978-80-87065-57-0 + přednáška

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M. (2014): Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD). Sborník příspěvků z konference PROSPERUJICI OLEJNINY 2014: 11.12. – 12.12. 2014, Praha a Větrný Jeníkov: Česká zemědělská společnost při ČZU v Praze, Sdružení Český mák a Katedra rostlinné výroby na ČZU v Praze, 2014, s. 78 - 81, ISBN 978-80-213-2517-3 (CD 978-80-213-2518-0)

TÓTH, P., HRUDOVÁ, E., GAJDOŠÍK, E., SCHOŘÍKOVÁ, A., SEIDENGLANZ, M., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J. (2014): Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k insekticidům. Sborník příspěvků z konference PROSPERUJICI OLEJNINY 2014: 11.12. – 12.12. 2014, Praha a Větrný Jeníkov: Česká zemědělská společnost při ČZU v Praze, Sdružení Český mák a Katedra rostlinné výroby na ČZU v Praze, 2014, s. 71 - 74, ISBN 978-80-213-2517-3 (CD 978-80-213-2518-0)

HRUDOVÁ E., TÓTH P., SEIDENGLANZ M., KOLAŘÍK P., HAVEL J. (2014): Vývoj výskytu populací blýskáčků (*Meligethes* spp.) rezistentních k pyretroidům na Jižní Moravě. *Úroda*, Vol. 62, č. 12/2014, vědecká příloha s. 251-254. ISSN 0139-6013

SEIDENGLANZ, M. (2014): Výskyt škůdců v porostech řepky ozimé v roce 2014. *Agrotip - informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce*, No. 11-12, 14-16. ISSN nemá

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., BERNARDOVÁ, M., SPITZER, T. (2015): Changes in *Meligethes aeneus* (Coleoptera: Nitidulidae) susceptibility to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011. *Plant Protect. Sci.*, Vol. 51, No.1: 24-44. ISSN 1212-2580

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., BERNARDOVÁ, M. (2015): *Meligethes aeneus* (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013. *Plant Protect. Sci.*, Vol. 51, No. 2: 94-107. ISSN 1212-2580

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M. (2015): Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu? *Úroda*, Vol. 63, No. 4, 66-70. ISSN 0139-6013

